

# Calendario de la Vacuna COVID-19 2023-24 – Calendario Rutinario

Edad*	Vacuna	Si no está vacunado	Si recibió alguna dosis anterior, administre la dosis de 2023-24
6 meses–4 años <sup>†</sup>	Pfizer–Bebés/Niños Pequeños		<p><b>Si 1 dosis previa, entonces:</b></p> <p>3-8** semanas <b>1</b> ≥8 semanas <b>2</b></p> <p><b>Si ≥2 dosis previas, entonces:</b></p> <p>≥8 semanas <b>1</b></p>
	Moderna–Pediátrico <sup>≠</sup>		<p><b>Si 1 dosis previa, entonces:</b></p> <p>4-8 semanas <b>1</b></p> <p><b>Si ≥2 dosis anteriores entonces:</b></p> <p>≥8 semanas <b>1</b></p>
5 –11 años	Moderna–Pediátrico <sup>≠</sup>		<p><b>Si 1 o más dosis previas (de cualquier marca), entonces<sup>^</sup>:</b></p> <p>≥2 meses </p>
	Pfizer–Pediátrico		
12+ años	Pfizer–Adol/Adulto (Comirnaty)		<p><b>Si 1 o más dosis previas (de cualquier marca), entonces<sup>^</sup>:</b></p> <p><b>12-64 años de edad:</b></p> <p>≥2 meses </p> <p><b>Mayores de 65 años:</b></p> <p>≥2 meses <b>1</b> ≥4 meses <b>2</b></p>
	Moderna–Adol/Adulto (Spikevax)		
	Novavax		

\* Consulte las [recomendaciones de los CDC](#) para niños en transición de un grupo de edad más joven a uno mayor.

† Los niños de 6 meses a 4 años deben recibir la misma marca de la vacuna actualizada que las dosis anteriores que recibieron.

\*\* Para algunas personas, puede ser preferible un [intervalo de 8 semanas](#), especialmente para hombres de 12 a 39 años.

≠ Todas las dosis de Moderna de 6 meses a 11 años son de 0.25 ml (25 mcg).

^ La vacuna Janssen (J & J) ha sido desautorizada. Siga el calendario de los que tienen 12+ años para cualquier dosis anterior.

[Consulte las Consideraciones Clínicas Provisionales Para el Uso de las Vacunas Contra el COVID-19](#) para obtener más detalles. El calendario esta sujeto a cambios.



# Calendario de la vacuna COVID-19 2023-24 *si está moderadamente o gravemente inmunocomprometido*

Edad	Vacuna	Si no está vacunado:	Si recibió alguna dosis anterior, administre las dosis de 2023-24:
6 meses– 4 años	<b>Pfizer</b> Bebés/niños pequeños		<p>1 dosis previa: 3 w <b>1</b> ≥8 w <b>2</b></p> <p>≥2 dosis previa: ≥8 w <b>1</b></p> <p>≥2 m</p> <p><b>Dosis Opcional*</b></p>
	<b>Moderna– Pediátrico</b>		<p>1 dosis previa: 4 w <b>1</b> ≥4 w <b>2</b></p> <p>2 dosis previas: ≥4 w <b>1</b></p> <p>≥2 m</p> <p><b>Dosis Opcional*</b></p>
5 –11 años	<b>Moderna– Pediátrico</b>		<p>≥3 dosis previas** ≥8 w <b>1</b> (para mayores de 5 años, la dosis de Pfizer también está bien)</p> <p>≥2 m</p> <p><b>Dosis Opcional*</b></p>
	<b>Pfizer– Pediátrico</b>		<p>1 dosis previas: 3 w <b>1</b> ≥4 w <b>2</b></p> <p>2 dosis previas: ≥4 w <b>1</b></p> <p>≥2 m</p> <p><b>Mayores de 65 años:</b> <b>1 dosis adicional*</b> de Moderna/ Pfizer</p>
12+ años	<b>Pfizer– Adol/Adulto (Comirnaty)</b>		<p>≥3 dosis previas**: ≥8 w <b>1</b></p> <p>≥2 m</p> <p><b>Mayores de 65 años:</b> <b>1 dosis adicional*</b> de Moderna/ Pfizer/ Novavax (opcional para los de 12-64 años*)</p>
	<b>Moderna– Adol/Adulto (Spikevax)</b>		<p>1 dosis previas: 4 w <b>1</b> ≥4 w <b>2</b></p> <p>2 dosis previas: ≥4 w <b>1</b></p> <p>≥3 dosis previas**: ≥8 w <b>1</b></p> <p>≥2 m</p> <p><b>Mayores de 65 años:</b> <b>1 dosis adicional*</b> de Moderna/ Pfizer/ Novavax (opcional para los de 12-64 años*)</p>
	<b>Novavax</b>		<p>≥1 dosis previas**: ≥2 m <b>1</b></p> <p>≥2 m</p> <p><b>Mayores de 65 años:</b> <b>1 dosis adicional*</b> de Moderna/ Pfizer/ Novavax (opcional para los de 12-64 años*)</p>

\* Se puede administrar una dosis opcional ≥2 meses después de la última dosis. Se pueden administrar dosis adicionales a discreción del proveedor de atención médica. Consulte la [Tabla 2](#) para conocer el vial y la dosis.

\*\* A los niños de 5 a 11 años se les puede administrar Moderna o Pfizer después de ≥3 dosis previas. A los mayores de 12 años se les puede administrar Moderna, Pfizer o Novavax.